

Krótkie doniesienie – Short communication

***Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae)  
– drugie stanowisko w Polsce**

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI<sup>1</sup>, GRZEGORZ DUBIEL<sup>2</sup>

<sup>1</sup>43-316 Bielsko-Biała, ul. Doliny Miętusiej 27/44, <sup>2</sup>43-360 Bystra, ul. Fałata 2d/2

e-mails: [1ggierlas@gmail.com](mailto:1ggierlas@gmail.com), [2gdubiel@o2.pl](mailto:2gdubiel@o2.pl)

**Abstract.** [*Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) – second record in Poland]. This note presents the second record of *Deraeocoris flavilinea* in Poland, and also the first in the Western Beskides.

**Key words:** Hemiptera, Heteroptera, Miridae, *Deraeocoris flavilinea*, faunistics, second record, Poland.

Rodzaj *Deraeocoris* Kirschbaum reprezentowany jest w faunie krajowej przez osiem gatunków: *D. annulipes* (Herrich-Schaeffer, 1842), *D. lutescens* (Schilling, 1837), *D. olivaceus* (Fabricius, 1777), *D. punctulatus* (Fallén, 1807), *D. ruber* (Linnaeus, 1758), *D. scutellaris* (Fabricius, 1794) oraz *D. trifasciatus* (Linnaeus, 1767), *D. flavilinea* (A. Costa, 1862), z których ostatni został stwierdzony niedawno (Gorczyca 2007; Gierlasiński 2015).

*Deraeocoris flavilinea* (A. Costa) jest stosunkowo łatwy do odróżnienia od pozostałych przedstawicieli tego rodzaju. Pomarańczowy klinik z czarnym wierzchołkiem, jasne, kontrastowe brzegi tarczki oraz jasna, tylna krawędź przedplecza stanowią unikatowy zbiór cech w grupie krajowych gatunków (Gorczyca i Herczek 2002).

Ostatnie pół wieku to okres szybkiego zwiększania się areálu występowania tego gatunku w Europie. Począwszy od 1961 roku, kiedy został stwierdzony na Korsyce, odnotowano jego obecność między innymi w Niemczech, Holandii, Danii, Luksemburgu, Belgii, Wielkiej Brytanii, a także niedawno w Bułgarii, na Węgrzech i w Polsce (Varga i in. 2014; Gierlasiński 2015).

Mając na uwadze lokalizację pierwszego stanowiska (Gdynia) i miejsce kolejnego odłowienia (Beskid Zachodni) oraz zdolność tego gatunku do migracji należy spodziewać się w dalszych latach kolejnych stwierdzeń tego gatunku w innych regionach Polski.

Poniżej podano nowe stanowisko tego pluskwiaka na terenie naszego kraju.

**Nowe stanowisko: Beskid Zachodni:** Bielsko-Biała (UTM CA52); 29.06.2016, 1 ex., na ligustrze (*Ligustrum*

*sp.*) w centrum miasta, przy ulicy Krasińskiego, leg. et det. G. Dubiel, ver. et coll. G. Gierlasiński.

Jest to pierwsze stwierdzenie tego gatunku w Beskidzie Zachodnim.



**Ryc. 1.** *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa), stanowiska w Polsce (czarne kółko, dane literaturowe; czerwone kółko, nowe stanowisko. [*Deraeocoris flavilinea* (A. Costa), localities in Poland (black circle, literature data; red circle, new record)]).

### Piśmiennictwo – References

Gierlasiński G. 2015. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **9**: 45–46.

Gorczyca J., Herczek A. 2002. *Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae.*

Klucze do oznaczania owadów Polski, Część XVIII  
Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Zeszyt  
6a.

Gorczyca J. 2007. *A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae.* Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.

Wagner E, Weber H. H. 1964. Heteropteres Miridae.  
*Faune de France* **67**, 591 ss.

Varga Á., Korányi D., Haltrich A., Markó V. 2014.  
First record of *Deraeocoris flavilinea* in Hungary  
(Heteroptera, Miridae: Deraeocorinae). *Folia Entomologica Hungarica* **75**: 9–13.



This work is licensed under a Creative Commons  
Attribution 4.0 International License  
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>