

**Nowe stanowisko *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)
(Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae)
w południowo-wschodniej Polsce**

JAROSŁAW BURY

Markowa 1498, 37-120 Markowa
e-mail: jarekbury2@wp.pl

Abstract. [New record of *Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781) (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) in south-eastern Poland]. A new locality of *Pinthaeus sanguinipes* in the East Beskidy Mts is presented. New data on its biology are also provided.

Wstęp

Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781), należący do podrodziny *Aso-pinae* w rodzinie *Pentatomidae*, był dotychczas wykazywany w Polsce z kilkunastu stanowisk, głównie w południowej części kraju (J.A. Lis 1990). W ostatnich latach znajdowano go również na pojedynczych stanowiskach w północnych i zachodnich regionach kraju (Hebda i Prze-woźny 2009; Korcz 2010).

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników obserwacji tego gatunku dokonanych w 2010 r. na Pogórzu Dynowskim. Nazwy systematyczne motyli podano za *Fauna Europaea* (Karsholt i van Nieukerken 2011).

Nowe stanowisko

Beskid Wschodni: Pogórze Dynowskie: Tarnawka [EA93], 18 IX 2010, kilkanaście osobników obserwowano podczas przelotów i zero-

wania - na niskiej roślinności drzewiastej pobrzeży dróg leśnych i na polanach leśnych. (Fot. 1, 2, 3, 4, 5).

Uwagi

Obserwacje prowadzono w obrębie następujących siedlisk: żyzne buczyny (*Dentario glandulosae-Fagenion*, *Galio odorati-Fagenion*) oraz grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-Carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*), zlokalizowanych w obrębie obszaru SOO „Nad Husowem” ujętego w sieci Natura 2000. Owady obserwowano w ich naturalnym środowisku oraz dokumentowano fotograficznie.




Fot. 1. *Pinthaeus sanguinipes* żerujący na gąsienicy *Acronicta rumicis* (Lepidoptera: Noctuidae) [fot. J. Bury].

Phot. 1. *Pinthaeus sanguinipes* preying on a caterpillar of *Acronicta rumicis* (Lepidoptera: Noctuidae) [photo by J. Bury].

Podczas obserwacji stwierdzono kilkanaście osobników *P. sanguinipes*, większość podczas dokonywania krótkich lotów oraz podczas żerowania na gąsienicach motyli z rodziny sówkowatych (Noctuidae): *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758) i *Subacronicta megacephala* (Denis et

Schifferrmüller, 1775) oraz na gąsienicach i poczwarkach bardzo licznie występującego na terenie badań chrząszcza z rodziny stonkowatych (Chrysomelidae), wstępnie zidentyfikowanego jako należącego do rodzaju *Chrysomela* L. Wszystkie osobniki *P. sanguinipes* obserwowano na niskiej roślinności drzewiastej, głównie młodych olchach (*Alnus* L.) i topolach (*Populus* L.), na dobrze nasłonecznionych miejscach – wzdłuż dróg leśnych i na polanach leśnych.




Fot. 2-3. *Pinthaeus sanguinipes* żerujący na gąsienicy *Subacronicta megacephala* (Lepidoptera: Noctuidae) [fot. J. Bury].

Phot. 2-3. *Pinthaeus sanguinipes* preying on a caterpillar of *Subacronicta megacephala* (Lepidoptera: Noctuidae) [photo by J. Bury].



Fot. 4. *Pinthaeus sanguinipes* żerujący na gąsienicy cf. *Chrysomela* sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) [fot. J. Bury].

Phot. 4. *Pinthaeus sanguinipes* preying on a caterpillar of cf. *Chrysomela* sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) [photo by J. Bury].



Fot. 5. *Pinthaeus sanguinipes* żerujący na poczwarcie cf. *Chrysomela* sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) [fot. J. Bury].

Phot. 5. *Pinthaeus sanguinipes* preying on a pupa of cf. *Chrysomela* sp. (Coleoptera: Chrysomelidae) [photo by J. Bury].

Obserwacje *P. sanguinipes* na stanowisku w Tarnawce, zlokalizowanym w obrębie SOO „Nad Husowem” potwierdzają tezę o możliwości liczniejszego wystąpienia tego gatunku w sprzyjających warunkach siedliskowych oraz korzystnych uwarunkowaniach pokarmowych. Obserwacje dokonane na Pogórzu Dynowskim świadczą również o możliwości szerszego występowania tego rzadkiego gatunku na terenie Polski i skłaniają do podjęcia dalszych badań, w celu uściślenia jego rozmieszczenia.

Piśmiennictwo

- K a r s h o l t O., N i e u k e r k e n v a n E. J. (2011) Fauna Europaea: Lepidoptera, Erebidae. Fauna Europaea, version 2.4., www.faunaeur.org [Odczyt z dnia: 31.08.2011].
- H e b d a G., P r z e w o ź n y M. (2009) New records of some heteropterans (Hemiptera: Heteroptera) rarely collected in Poland. *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **42**: 63-66.

- K o r c z A. (2010) New records of bugs rarely collected in Poland (Hemiptera: Heteroptera). *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **2**: 19-34.
- L i s J. A. (1990) Shield-bugs of Poland (*Heteroptera, Pentatomoidea*) – a faunistic review. Pentatomidae. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **1**: 5-102.
-